


Programe de Prevenirea și Controlul Infecțiilor

În fiecare unitate medicală este implementat un **Program de Prevenirea și Controlul Infecțiilor (PCI)**, variabil în funcție de necesități, cu următoarele componente generale:

1. Supravegherea patologiei infecțioase nosocomiale;
2. Depistarea și managementul izbucnirilor epidemice;
3. Monitorizarea și controlul antibioterapiei;
4. Dezvoltarea și implementarea unor programe de reducere a riscului pentru infecțiile nosocomiale;
5. Monitorizarea mediului de spital în privința igienei și a eventualelor riscuri infecțioase implicate de deșeurile medicale sau construcția clădirii (cu asigurarea circuitelor funcționale și a cerințelor legale proprii fiecărui departament);
6. Sterilizarea și decontaminarea instrumentarului/materialelor sanitare;
7. Educația pacienților și a personalului medical;
8. Programe de sănătate ocupațională, adresate personalului, ce vizează profilaxia postexpunere la diferiți agenți patogeni, profilaxia transmiterii aerogene și managementul cadrelor medicale infectate.

5 MOMENTE IMPORTANTE PENTRU IGIENA MÂINILOR



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

Logo
DSP

DIRECȚIA DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
JUDEȚUL



CENTRUL NAȚIONAL DE
EVALUARE ȘI PROMOVARE A
STĂRII DE SĂNĂTATE



CENTRUL REGIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ
TIMIȘOARA

Material realizat în cadrul Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății. Pentru distribuție gratuită.

SALVEAZĂ VIETI Igiena Mâinilor

5 mai 2019



ÎNGRIJIREA CURATĂ ESTE ÎN MÂINILE VOASTRE

#IgienaMâinilor #ControlulInfecțiilor #SănătatePentruToți

IAAM

- Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM), menționate și ca „nosocomiale” sau „de spital”, reprezintă infecțiile care apar la un pacient în timpul procesului de asistență medicală într-un spital sau în altă unitate medicală, infecție care nu era prezentă sau în incubatie la data internării.
- IAAM pot afecta pacienții în orice tip de cadru unde aceștia primesc îngrijire și pot apărea după externare.
- Mai mult, aceste IAAM includ infecțiile ocupaționale în rândul personalului medico-sanitar.
- IAAM reprezintă cel mai frecvent efect advers din timpul furnizării serviciilor medicale și până în prezent, nici o instituție medicală sau țară nu poate pretinde că a rezolvat această problemă.

Prevenirea IAAM

Personalul managerial și cel din cadrul departamentului PCI trebuie să se implice în:

- ✓ educarea angajaților din spital privind controlul bolilor transmisibile;
- ✓ activitățile de decontaminare/sterilizare;
- ✓ conduita preventivă față de agenții cu transmitere parenterală/aeriană.

ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

IGIENA MÂNILOR este cheia reducerii prevalenței infecțiilor asociate asistenței medicale.

Mesajul OMS pentru coordonatorii Programelor de Prevenirea și Controlul Infecțiilor:

„Monitorizați standardele de prevenirea și controlul infecțiilor – acționați și îmbunătățiți practicile.”



IAAM la nivel european, conform OMS:

Se estimează că, în jur de 80000 pacienți din spitalele din Europa au cel puțin o IAAM, în orice zi dată.

În medie, IAAM afectează 7% din pacienții din țările dezvoltate, respectiv 15% din pacienții din țările slab și mediu dezvoltate.

În țările dezvoltate, 30% din pacienții din unitățile de terapie intensivă (UTI) au cel puțin una din IAAM.

În țările slab și mediu dezvoltate, frecvența infecției dobândite în UTI este de cel puțin 2-3 ori mai mare decât în țările dezvoltate, iar densitatea infecțiilor asociate dispozitivelor este de 13 ori mai mare decât în SUA.

IAAM la nivel național, conform INSP:

Analiza raportării statistice a infecțiilor asociate asistenței medicale în România se face pe baza datelor comunicate de spitalele publice și private; conform CNSCBT, incidența calculată pentru anul 2016 a fost de 0,44%.

Conform Centrului Național pentru Statistică și Informatică în Sănătate Publică (CNSISP), numărul infecțiilor interioare raportate în anul 2017 a fost de 19607 cazuri, dintre care cele mai multe digestive (8019 cazuri), respiratorii (3549), urinare (2568) și de plagă chirurgicală (2297).